Bruton 酪氨酸激酶在对乙酰氨基酚诱导的小鼠肝损伤中变化及意义

刘晓庆 鲁桓兵 刘瑞雪 宋育林

摘要 目的 观察对乙酰氨基酚(APAP)诱导的小鼠急性肝损伤中 Bruton 酪氨酸激酶(Btk)、磷酸化 Btk(p-Btk)、核因子 κ B(NF- κ B)、核苷酸结合寡聚域样受体蛋白3(NLRP3)、白细胞介素 1β (IL- 1β)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)的动态变化,初步探讨 Btk 在 APAP 诱导的急性肝损伤中的作用。方法 随机将 54 只小鼠分为 9 组,分别为对照组、APAP 0.5 h 组、APAP 1 h 组、APAP 3 h 组、APAP 6 h 组、APAP 12 h 组、APAP 24 h 组、APAP 36 h 组、APAP 48 h 组,每组 6 只。禁食 12 h 后,单次腹腔注射 APAP(300 mg/kg) 0.5、1、3、6、12、24、36、48 h 后处死相应组别的小鼠。测定各组血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST);观察各组肝脏病理变化;ELISA 测定各组肝组织匀浆中 IL- 1β 和 TNF- α ;Western blot 测定肝组织中 Btk、p-Btk、NF- κ B 及 NLRP3 表达。结果 与对照组比较,APAP 干预后的各组血清 ALT($F=100.968$, $P=0.000$)、AST($F=73.539$, $P=0.000$)、肝脏坏死程度($F=29.845$, $P=0.000$)、肝脏 Btk($F=441.280$, $P=0.000$)、p-Btk($F=1323.022$, $P=0.000$)、NF- κ B($F=133.125$, $P=0.000$)及 NLRP3 水平($F=820.095$, $P=0.000$)、IL- 1β ($F=8.643$, $P=0.000$)、TNF- α ($F=20.545$, $P=0.000$)含量均有变化,其中 24 h 的各种指标最高。结论

单次腹腔注射 APAP 诱导的小鼠肝损伤呈现动态变化,其病理机制可能与其激活 Btk,导致 NLRP3 形成、NF- κ B 激活及炎症因子升高有关。

关键词 对乙酰氨基酚;药物性肝损伤;Bruton 酪氨酸激酶;NF- κ B;NLRP3

中图分类号 R 575; R 99

文献标志码 A 文章编号 1000-1492(2020)08-1180-05
doi: 10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2020.08.006

对乙酰氨基酚(acetaminophen, APAP)是目前普遍使用的解热镇痛剂,过量使用则可导致严重的肝功能损害甚至急性肝衰竭乃至死亡,是药物性肝

损伤及肝衰竭的常见原因。APAP 所致肝损伤发病机制复杂,涉及多种机制,可能与活性代谢产物的形成、氧化应激、内质网应激、自噬、无菌性炎症等有关^[1],确切机制目前仍不明确。核苷酸结合寡聚域样受体蛋白 3(nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3, NLRP3)是肝脏中研究较多的炎性小体,其活化后可引起白细胞介素(interleukin, IL)- 1β 、IL-18 等炎症因子的释放,参与 APAP 诱导的肝损伤^[2]。Bruton 酪氨酸激酶(Bruton's tyrosine kinase, Btk)是胞浆非受体酪氨酸蛋白 Tec 家族成员之一,对 B 淋巴细胞的增殖、分化和凋亡起着重要的调控作用^[3]。近期有文献报道^[4]Btk 是先天免疫炎症反应中的关键因子,可通过调控核因子 κ B(nuclear factor κ B, NF- κ B)引起 NLRP3 的激活,也可直接调控 NLRP3 的激活。已有研究^[5]表明 Btk 参与缺血再灌注性肝损伤,抑制 Btk 可减轻肝脏的炎性损伤,然而其在 APAP 诱导的肝损伤中的作用及机制目前未见相关文献报道,该研究重点研究 APAP 诱导的肝损伤中 Btk、磷酸化 Btk(phosphorylated Btk, p-Btk)、NF- κ B、NLRP3、IL- 1β 、肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α)的动态变化,从而探讨 Btk 在 APAP 肝损伤中的重要作用及机制。

1 材料与方法

1.1 实验动物 54 只 SPF 级健康成年的 C57BL/6J 雄性小鼠,鼠龄 6~8 周,体质量 18~24 g,购自斯贝福(北京)生物技术有限公司,动物许可证号:SCXK(京)2016-0002。

1.2 实验材料与仪器 APAP(纯度大于 99%)购自美国 MedChemExpress 公司;小鼠 TNF- α 、IL- 1β elisa 试剂盒购自武汉基因美生物科技有限公司;Btk 抗体[Btk(D3H5) Rabbit mAb $\times$ 8547]、p-Btk 抗体均购自美国 Cell Signaling 公司;NLRP3 抗体购自英国 Abcam 公司;NF- κ B 抗体购自英国 Abcam 公司;RI-PA 裂解液、SDS-PAGE(5 $\times$)蛋白上样缓冲液均购自上海碧云天生物技术有限公司;全自动生化分析

2019-12-06 接收

基金项目:安徽高校科研平台创新团队建设项目-药物性肝损伤团队(编号:皖教秘科[2015]49号)

作者单位:安徽医科大学第一附属医院消化内科,安徽省消化系统疾病重点实验室,合肥 230022

作者简介:刘晓庆,女,硕士研究生;

宋育林,男,主任医师,硕士生导师,责任作者, E-mail: ylsongen@163.com

仪购自瑞士 RocheModular 公司;紫外分光光度计购自上海菁华科技仪器有限公司产品;成像系统购自美国阿尔法公司产品。

1.3 方法

1.3.1 实验分组与方法 适应性饲养 1 周后,54 只小鼠随机分为 9 组,每周 6 只,分别为对照组 (APAP 0 h 组)、APAP 0.5 h 组、APAP 1 h 组、APAP 3 h 组、APAP 6 h 组、APAP 12 h 组、APAP 24 h 组、APAP 36 h 组、APAP 48 h 组,所有小鼠禁食不禁水 12 h 后,APAP 0.5 h 组、APAP 1 h 组、APAP 3 h 组、APAP 6 h 组、APAP 12 h 组、APAP 24 h 组、APAP 36 h 组、APAP 48 h 组小鼠分别单剂量腹腔注射 APAP 300 mg/kg,对照组小鼠腹腔注射 0.9% 生理盐水同等质量 APAP 组小鼠。所有小鼠自由进食水,明暗各 12 h,温度 20 ~ 25 °C,相对湿度 (50 ± 5) %。所有小鼠均自由进食标准饲料。分别在相应的时间小鼠处死前称量小鼠体质量,用 10% 的水合氯醛 (4 ml/kg) 腹腔注射麻醉后摘除小鼠眼球收集血液,断头处死。全血标本于 4 °C 冰箱静置过夜后,3 500 r/min 离心 15 min 留取上清液,-20 °C 冻存待测。剪取部分肝左叶用 10% 福尔马林缓冲液固定行肝脏病理学检查,其余肝脏组织冻存于液氮中,随后转移至 -80 °C 冰箱储存待测。

1.3.2 血清丙氨酸氨基转移酶 (alanine aminotransferase,ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (aspartate aminotransferase,AST) 活性检测 全自动化生化分析仪检测 ALT、AST 活性。

1.3.3 肝组织病理学观察 经 10% 福尔马林缓冲液固定的肝脏标本,常规脱水,石蜡包埋,切片 (厚 5 μm),HE 染色,光学显微镜下观察肝组织病理形态学改变。采用 Image-Pro Plus 6.0 高清晰图像分析系统进行分析。计算肝脏坏死面积百分比 = (阳性细胞所占面积/整个视野总面积) × 100%。

1.3.4 ELISA 检测肝匀浆 IL-1β 和 TNF-α 的表达 剪取 -80 °C 冻存的肝组织按 1 : 9 (g : ml) 加入相应的 PBS 匀浆肝组织,留取上清液,严格按照试剂盒说明书操作步骤测定 IL-1β、TNF-α。

1.3.5 Western blot 检测肝脏 Btk、p-Btk、NF-κB、NLRP3 蛋白表达 剪取适量的肝组织加入 RIPA 裂解液充分匀浆提取总蛋白。用 BCA 法进行蛋白定量。加入 SDS-PAGE (5 ×) 蛋白上样缓冲液,沸水中煮沸 5 min,-80 °C 冰箱中冻存。以 β-actin (1 : 1 000) 作为内参,以抗 Btk 抗体 (1 : 3 000)、抗 p-Btk 抗体 (1 : 1 000)、抗 NF-κB 抗体 (1 : 5 000)、

抗 NLRP3 抗体 (1 : 2 500) 和抗 β-actin 抗体 (1 : 1 000) 作为一抗进行聚丙烯酰胺凝胶电泳。采用自动化学发光系统拍摄分析。

1.4 统计学处理 采用 SPSS 25.0 进行统计学分析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示。多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用 LSD-*t* 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ALT 和 AST 酶活性检测结果 与对照组比较,APAP 腹腔注射 0.5、1 h 组小鼠血清 ALT、AST 水平差异无统计学意义 ($P > 0.05$); 给药后 3 h 血清 ALT、AST 升高,持续至 24 h 仍维持在较高水平 ($P < 0.01$),36、48 h 血清 ALT、AST 下降,但仍高于对照组 ($P < 0.01$)。见表 1。

表 1 不同时间点血清 ALT、AST 变化 ($n = 6, \bar{x} \pm s$)

组别	ALT (U/L)	AST (U/L)
对照	36.17 ± 5.85	116.33 ± 24.01
APAP 0.5 h	37.33 ± 4.37 [#]	140.33 ± 29.45 [#]
APAP 1 h	50.33 ± 10.09 [#]	210.33 ± 77.78 [#]
APAP 3 h	3 092.17 ± 633.38 ^{* #}	2 537.00 ± 700.39 ^{* #}
APAP 6 h	4 294.50 ± 797.21 [*]	3 693.00 ± 942.40 ^{* Δ}
APAP 12 h	4 822.17 ± 743.74 [*]	4 400.50 ± 503.60 [*]
APAP 24 h	4 554.00 ± 730.81 [*]	4 304.33 ± 835.77 [*]
APAP 36 h	1 533.83 ± 280.11 ^{* #}	1 122.33 ± 236.24 ^{* #}
APAP 48 h	1 000.67 ± 182.90 ^{* #}	951.50 ± 133.10 ^{* #}
F 值	100.968	73.539
P 值	0.000	0.000

与对照组比较: * $P < 0.01$; 与 APAP 24 h 比较: Δ $P < 0.05$, # $P < 0.01$

2.2 肝组织病理检查结果 对照组,肝小叶结构正常,未见肝细胞变性、坏死以及肝窦充血。APAP 处理后 0.5、1 h 肝脏病理形态学与对照组比较差异无统计学意义。APAP 处理后 3 h 肝窦充血,可见点状坏死灶,APAP 处理后 6、12 h 肝窦充血明显,坏死面积逐渐增大,持续至 24 h,主要表现为小叶中心性坏死;APAP 处理 36 h 后肝脏病理变化逐渐减轻,坏死面积逐渐减少。APAP 干预后的各组小鼠肝脏坏死程度较对照组有变化 ($F = 29.845, P = 0.000$)。见图 1、2。

2.3 肝组织匀浆 IL-1β、TNF-α 检测结果 与对照组比较,APAP 腹腔注射 1、3 h 后,TNF-α、IL-1β 分别开始升高,且均在 24 h 时含量最高 ($P < 0.01$),后逐渐降低。见表 2。

2.4 Western blot 检测结果 与对照组比较,APAP 干预后的各组小鼠肝脏 Btk ($F = 441.280$,

图1 不同时间点肝脏病理学变化 × 200

A: 对照组; B: APAP 0.5 h 组; C: APAP 1 h 组; D: APAP 3 h 组; E: APAP 6 h 组; F: APAP 12 h 组; G: APAP 24 h 组; H: APAP 36 h 组; I: APAP 48 h 组

表2 不同时间点肝组织 IL-1β、TNF-α 表达量 (n = 6, $\bar{x} \pm s$)

组别	IL-1β(pg/ml)	TNF-α(pg/ml)
对照	47.64 ± 4.83	267.64 ± 36.88
APAP 0.5 h	53.33 ± 6.56 [#]	296.87 ± 12.88 [#]
APAP 1 h	54.05 ± 8.90 [#]	334.63 ± 39.95 ^{* #}
APAP 3 h	61.16 ± 9.01 ^{△#}	380.42 ± 41.38 ^{* #}
APAP 6 h	64.22 ± 8.39 ^{* #}	418.57 ± 34.35 [*]
APAP 12 h	74.64 ± 7.78 [*]	441.26 ± 20.56 [*]
APAP 24 h	81.28 ± 7.53 [*]	454.82 ± 32.79 [*]
APAP 36 h	74.64 ± 18.92 [*]	389.08 ± 51.33 ^{* #}
APAP 48 h	56.70 ± 7.42 [#]	370.88 ± 20.12 ^{* #}
F 值	8.643	20.545
P 值	0.000	0.000

与对照组比较: [△]P < 0.05, ^{*}P < 0.01; 与 APAP 24 h 组比较: [#]P < 0.01

P = 0.000)、p-Btk (F = 1323.022, P = 0.000)、NF-κB (F = 133.125, P = 0.000) 及 NLRP3 水平 (F = 820.095, P = 0.000) 含量均有变化。正常肝组织中仅有少量的 Btk 表达, APAP 处理组小鼠随着给药时间的延长, Btk 及 p-Btk 的表达逐渐增多, 于 24 h 表达最高 (P < 0.01), 后表达逐渐下降。NF-κB、NLRP3 表达与 Btk 及 p-Btk 表达变化趋势相一致。见图 3。

图2 不同时间点小鼠肝脏坏死面积

与对照组比较: ^{*}P < 0.01; 与 APAP 24 h 组比较: [#]P < 0.01

3 讨论

APAP 引起的肝损伤病理组织学主要表现为肝小叶中心性坏死^[6-7]。ALT、AST 是目前评价肝脏损伤程度的常用指标。本实验结果显示, 小鼠单次腹腔注射 APAP (300 mg/kg) 0.5、1 h, 血清 ALT、AST 及肝脏病理形态学与对照组无明显差异; 其余各组血清中 ALT、AST 水平、3 h 后各组肝细胞坏死面积明显高于对照组, 同时肝脏 HE 染色也可见不

图3 各组小鼠肝组织 Btk、p-Btk、NF-κB、NLRP3 蛋白表达情况与对照组比较: * $P < 0.01$

同程度的肝窦充血。这些生化及病理改变与相关文献报道^[6-7]一致,提示 APAP 诱导的小鼠肝损伤模型复制成功。本实验研究发现 APAP(300 mg/kg)单次干预造成的肝损伤并非完全随时间的延长而加重,36 h 后肝损伤的程度有所减轻,提示单次 APAP 造成的小鼠肝损伤存在自身修复过程。

APAP 诱导的肝细胞坏死的发生与过量服用 APAP 或肝脏基础水平还原型谷胱甘肽被耗竭,代谢产生的 N-乙酰对苯醌亚胺不能被肝脏还原型谷胱甘肽结合,造成肝细胞代谢损伤和氧化应激损伤,破坏线粒体膜等有关^[1]。Btk 是一种非受体酪氨酸激酶,表达于除 T 淋巴细胞及浆细胞的髓系细胞。Btk 通过调控中性粒细胞募集和激活参与炎症过程^[5]。当细胞受到细菌、真菌、病毒及其他危险信号的刺激时,Btk 以磷酸化的形式活化后可直接调节 NLRP3 或间接调节 NLRP3 等信号而引起炎症因子的释放^[3-4]。Btk 参与调控多个重要炎症信号转导通路中许多关键的信号蛋白,包括 NF-κB、NFAT、PKC、Pin1、TLRs、caveolin-1 等^[8]。近期研究^[5]表明在小鼠肝脏缺血再灌注损伤模型中,Btk 抑制剂可减轻缺血再灌注引起的肝脏炎症损伤。本

实验结果显示:正常小鼠肝组织中仅有少量 Btk 表达;APAP 作用 24 h 内,随着 APAP 作用时间的延长,小鼠肝组织中 Btk 及 p-Btk 逐渐升高,肝损伤的严重程度与 Btk 及 p-Btk 表达变化趋势相一致。提示 Btk 的活化参与了 APAP 肝损伤病理的形成。

Btk 是先天免疫炎症反应中的关键因子,参与调控炎症信号转导通路中许多关键的信号蛋白^[4,8],其参与 APAP 诱导的肝损伤可能作用机制为:① 激活 NF-κB 导致 NLRP3 形成及炎症因子升高。文献报道 Btk/NF-κB 信号通路可参与视神经脊髓炎的发病,引起急性炎症^[9]。NF-κB 可激活 NLRP3 炎症体造成炎症因子过度表达,进而导致炎症和自身免疫疾病的进展^[10-11]。抑制 Btk、NF-κB 信号通路可显著控制炎症及减轻疾病^[12-13]。通过药物或遗传手段抑制 Btk 可严重抑制 NLRP3 炎症小体的激活,减轻 IL-1β、IL-6、TNF-α 等炎症因子的释放,进而减轻缺血性脑损伤引起的炎症反应^[14]。本实验结果显示,正常小鼠肝组织中仅有少量 Btk 表达,随着 APAP 作用时间的延长,小鼠肝组织中 Btk 及 p-Btk 逐渐升高,NF-κB、NLRP3、IL-1β、TNF-α 表达也逐渐升高,肝损伤的严重程度与 Btk 及 p-Btk、NF-κB、NLRP3、IL-1β、TNF-α 表达变化趋势相一致。表明 Btk 磷酸化可能激活了 NF-κB 导致 NLRP3 形成及炎症因子升高引起了肝损伤。② 直接激活 NLRP3 炎症小体。NLRP3 炎症小体的激活一方面主要通过激活 NF-κB 通路上调 NLRP3 和 pro-IL-1β 的蛋白表达,另一方面线粒体 DNA、穿孔毒素、病原体相关成分等信号也参与其激活^[15]。近年来有文献^[14]报道 Btk 是 NLRP3 炎症小体的重要组成部分,在炎症小体中起重要作用,可通过物理方式直接与 NLRP3、ASC 相互作用,激活炎症反应,引起炎症损伤。但 APAP 导致的急性肝损伤中,Btk 激活 NLRP3 的确切机制尚有待进一步探讨。

综上所述,本研究结果显示,Btk 在单次 APAP 致肝损伤的过程中存在动态变化,APAP 诱导的肝损伤中 Btk、p-Btk、NF-κB、NLRP3、IL-1β、TNF-α 表达变化与肝损伤的严重程度基本相一致,表明 Btk 可能在 APAP 肝损伤中起着重要作用,将为寻找 APAP 肝损伤新的防治靶点提供了理论基础。

参考文献

- [1] Yan M, Huo Y, Yin S, et al. Mechanisms of acetaminophen-induced liver injury and its implications for therapeutic interventions [J]. Redox Biol 2018, 17: 274-83.

- [2] 贺希,刘鸿凌.炎症小体在对乙酰氨基酚所致肝损伤及急性肝衰竭中的作用[J].肝脏,2018,23(2):108-10.
- [3] 李庆伟,芦静,刘欣.Bruton酪氨酸激酶 Btk 的生物学特性研究进展[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2010,33(1):90-5.
- [4] Weber A N R ,Bittner Z ,Liu X ,et al. Bruton's tyrosine kinase: an emerging key player in innate immunity[J]. *Front Immunol* 2017 , 8: 1454.
- [5] Palumbo T ,Nakamura K ,Lassman C ,et al. Bruton tyrosine kinase inhibition attenuates liver damage in a mouse warm ischemia and reperfusion model[J]. *Transplantation* 2017 ,101(2): 322-31.
- [6] 路燕,雷宇,章礼久等.不同性别小鼠对乙酰氨基酚急性肝损伤的敏感性差异[J].常州大学学报(自然科学版),2017,29(6):83-91.
- [7] Feng Y ,Cui R ,Li Z ,et al. Methane alleviates acetaminophen-induced liver injury by inhibiting inflammation , Oxidative Stress , Endoplasmic reticulum stress , and apoptosis through the Nrf2/HO-1/NQO1 signaling pathway [J]. *Oxid Med Cell Longev* ,2019, 2019: 7067619.
- [8] 孟辉,曹大伟,侯明霞等.不同时间高氧下小鼠肺组织中 Bruton 酪氨酸激酶的变化及意义[J/CD].中华临床医师杂志(电子版)2016,10(15):2310-13.
- [9] 王炜,王素欢,李世平等. Btk/NF- κ B 信号通路在视神经脊髓炎谱系疾病中变化及意义[J].中风湿与神经疾病杂志,2019,36(8):692-6.
- [10] 王丽娜,叶丹丹,王娇娇等.粪肠球菌脂磷壁酸通过激活 NF- κ B 活化 NLRP3 炎症体[J].中国微生态学杂志,2018,30(5):506-10.
- [11] Hu Z ,Song B ,Xu L ,et al. Aqueous synthesized quantum dots interfere with the NF- κ B pathway and confer anti-tumor , anti-viral and anti-inflammatory effects [J]. *Biomaterials* ,2016 ,108: 187-96.
- [12] Chen Y ,Peubez C ,Smith V ,et al. CUDC-907 blocks multiple pro-survival signals and abrogates microenvironment protection in CLL [J]. *J Cell Mol Med* 2019 23(1):340-8.
- [13] Fan Z ,Wang Y ,Xu X ,et al. Inhibitor of Bruton's tyrosine kinases , PCI-32765 , decreases pro-inflammatory mediators' production in high glucose-induced macrophages [J]. *Int Immunopharmacol* , 2018 58: 145-53.
- [14] Ito M ,Shichita T ,Okada M ,et al. Bruton's tyrosine kinase is essential for NLRP3 inflammasome activation and contributes to ischemic brain injury[J]. *Nat Commun* 2015 6:7360.
- [15] 蒋丹露,刘阳阳,孙如愚等. NLRP3 炎症小体介导的炎症相关疾病研究进展[J].生命科学,2017,29(9):898-907.

Changes and significance of Bruton's tyrosine kinase in acetaminophen induced liver injury in mice

Liu Xiaoqing ,Lu Huanbing ,Liu Ruixue , et al

(Dept of Gastroenterology ,The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University ,Hefei 230022)

Abstract Objective To observe the dynamic changes of Bruton's tyrosine kinase (Btk) , phosphorylated Btk (p-Btk) , nuclear factor κ B (NF- κ B) , nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3 (NLRP3) , interleukin-1 β (IL-1 β) , tumor necrosis factor- α (TNF- α) in acute liver injury induced by acetaminophen (APAP) in mice , and preliminarily explore the role of Btk in acute liver injury induced by APAP. **Methods** 54 mice were randomly divided into 9 groups , including control group , APAP 0.5h group , APAP1h group , APAP3h group , APAP6h group , APAP12h group , APAP24h group , APAP36h group and APAP48h group. After fasting for 12h , mice in the corresponding groups were sacrificed after a single intraperitoneal injection of APAP(300 mg/kg) for 0.5 h , 1 h , 3 h , 6 h , 12 h , 24 h , 36 h and 48 h. Serum alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were measured by chemical method. Liver tissue damage was observed by HE staining. IL-1 β and TNF- α in liver tissue homogenate were measured by ELSIA. The expression of Btk , p-Btk , NF- κ B and NLRP3 was determined by Western blot. **Results** Compared with the control group , serum ALT ($F = 100.968$, $P = 0.000$) , AST ($F = 73.539$, $P = 0.000$) , liver necrosis degree ($F = 29.845$, $P = 0.000$) , liver Btk ($F = 441.280$, $P = 0.000$) , p-Btk ($F = 1323.022$, $P = 0.000$) , NF- κ B ($F = 133.125$, $P = 0.000$) , NLRP3 levels ($F = 820.095$, $P = 0.000$) and the content of IL-1 β ($F = 8.643$, $P = 0.000$) , TNF- α ($F = 20.545$, $P = 0.000$) all changed. Among them , the various kinds index of 24h was respectively the highest. **Conclusion** Liver injury induced by single intraperitoneal injection of APAP shows dynamic changes , which pathogenesis may be related to APAP-induced activation of Btk , resulting in formation of NLRP3 , activation of NF- κ B and increase of inflammatory factors.

Key words acetaminophen; drug-induced liver injury; Bruton's tyrosine kinase; NF- κ B; NLRP3