EB 病毒 miR-BART4* 和 miR-BART18-3p 在鼻咽癌中的表达及意义

李璐¹, 王建红¹, 黄辉², 范才文¹, 肖胜军¹, 熊伟明², 雷迅²

摘要 目的 分析 EB 病毒(EBV) miRNAs 在鼻咽癌组织中的表达,探索 EBV 诱发鼻咽癌的分子机制,寻找鼻咽癌防治和诊断的生物分子标志物。方法 采用实时荧光定量 PCR 分析 EBV miRNAs ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 在 36 例鼻咽低分化鳞癌组织和 32 例慢性鼻咽黏膜炎症组织中的表达水平。结果 ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 的表达水平(Ct 值)在鼻咽癌组织中分别为 (26.97 ± 2.67) 和 (27.02 ± 2.32), 在鼻咽黏膜炎症组织中的表达水平分别为 (38.49 ± 3.05) 和 (39.39 ± 2.16), 两种 EBV miRNAs 在鼻咽癌组织中的表达明显高于鼻咽黏膜炎症组织,差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。结论 EBV 可能通过 ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 高表达诱发鼻咽癌,它们是鼻咽癌诊断和防治的潜在生物分子标志物。

关键词 鼻咽癌;生物分子标志物;EB 病毒微小 RNA

中图分类号 R 739.63

文献标志码 A 文章编号 1000-1492(2015)09-1267-04

鼻咽癌是遗传和环境因素共同作用的典型疾病。世界各地鼻咽癌患者的癌组织中均可检出 EB 病毒(EBV) DNA 和病毒核抗原。EBV 伴随鼻咽癌的整个发生过程,尤其是在低分化和未分化的鼻咽癌上皮肿瘤组织中,几乎所有的肿瘤细胞都含有 EBV 基因组^[1]。EBV 整合可以提高染色体的不稳定性,引起基因表达水平变化,诱导细胞增殖和肿瘤形成的关键基因表达异常,促进细胞恶性转化^[2]。近来发现的 miRNA 是细胞内的一类非编码 RNA,对基因表达有调节作用,是真核细胞生命活动的调控分子。miRNA 有调控 10% ~ 30% 人类基因的潜能,已经成为研究肿瘤发生与调控机制的一个新领域,研究^[3]表明 miRNAs 可以控制细胞的生物学进程,如细胞增殖、分化和转移。miRNA 的异常表达可以导致肿瘤的发生,这些异常表达的 miRNAs 是潜在的癌基因或抑癌基因,通过调控下游靶基因参与肿瘤的形成^[4]。EBV 编码的 miRNAs 参与调控鼻咽癌细胞的生长和分化^[5]。因此,EBV miRNA 相关研究成果将为鼻咽癌的诊断、预后和治疗提供新的

2015-04-29 接收

基金项目:广西自然科学基金项目(编号:2011GXNSFD018034);广西教育厅科研项目(编号:2013YB168);广西医学科学实验中心开放基金专项项目(编号:KFJJ2010-51);广西科学研究与技术开发计划项目(编号:桂科攻 0592007-1J)

作者单位:¹桂林医学院生物化学与分子生物学教研室,桂林 541004

²桂林医学院附属医院耳鼻咽喉头颈外科,桂林 541001

作者简介:李璐,女,硕士研究生;

雷迅,男,教授,责任作者,E-mail: yypeng_7@hotmail.com

in vitro. **Results** Two libraries could meet the requirement for the *in vitro* molecular evolution. SPA single domain structure A in 29, 30 amino acids site-directed mutation was library (A1), structure C in 36, 37 site-directed mutation was library (C1), SPA single domain structure A insert 3 amino acids after 37 random peptide was library (A₁₃₇), SPA single domain structure C after 20 insert 3 random peptide was library (C₁₂₀). The phage display library which was made up of a random combination of A1 and C1 named "A1C1". And the phage display library which was made up of a random combination of A₁₃₇ and C₁₂₀ named "A₁₃₇C₁₂₀". The capacity of these two libraries were respectively: 3.0×10^6 and 2.0×10^6 . The titers were respectively: 2.3×10^{12} and 2.1×10^{12} (TU/ml). These two libraries had evolved completely through four or five times of affinity screening. Besides, Phage-Elisa monoclonal obtained a monoclonal with high OD, and the testing analytical result was A_(Q29K30), A_(I29I30) and A_{I37-TQS}. **Conclusion** A fixed point mutation molecules A_(Q29K30), A_(I29I30) and insertion mutation molecular A_{I37-TQS} are obtained with the high combining ability. The study shows the relationship of the structure and function of Ig-binding molecules and lays a foundation for directed improvement of Ig-binding molecules and acquirement of new Ig-binding molecules with new Ig-binding characteristics.

Key words AC mutants; phage-displayed library; selection; human IgG

分子基础。该研究观察 EBV miRNA (ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p) 在鼻咽癌组织中的表达,探索其在 EBV 致鼻咽癌中的作用,寻找鼻咽癌防治和诊断的生物分子标志物。

1 材料与方法

1.1 病例资料 鼻咽癌和鼻咽炎症组织标本来自桂林医学院附属医院,经临床组织病理学确诊为鼻咽低分化鳞癌和慢性鼻咽黏膜炎症组织。鼻咽低分化鳞癌组织 36 例,男 20 例,女 16 例,年龄 36 ~ 60 (47.92 ± 6.80) 岁;鼻咽炎症组织标本 32 例,男 16 例,女 16 例,年龄 21 ~ 62 (43.66 ± 12.40) 岁。标本采集前经桂林医学院附属医院伦理委员会同意,患者知情同意后采集分析。

1.2 实验仪器与试剂 荧光定量 PCR 仪 7500(美国 ABI 公司);生物分光光度计(德国 Eppendorf 公司);RNA 提取试剂 TRIzol (美国 Invitrogen 公司);通用 cDNA 合成试剂盒、SYBR® Green master mix, Universal RT、U6 snRNA(hsa ,mmu ,rno) PCR primer set、UniRT(丹麦 Exiqon 公司)。

1.3 实验方法

1.3.1 引物合成 通过 miRNA 数据库查找拟研究 EBV-miRNA 序列: ① ebv-miR-BART4*: CACAU-CACGUAGGCACCAGGUGU; ② ebv-miR-BART18-3p: UAUCGGAAGUUUGGCUUCGUC,由丹麦 Exiqon 公司合成 LUN™ PCR 引物。

1.3.2 组织总 RNA 的提取 采用 RNA 试剂盒 TRIzol 提取组织总 RNA,生物分光光度计检测总 RNA 的浓度和纯度,吸光度(absorbance ,A) 比值 A_{260}/A_{280} 在 1.8 ~ 2.1,置 -80 °C 保存备用。

1.3.3 实时荧光定量 PCR 分析 采用 cDNA 合成试剂盒进行逆转录,按照说明配制反应体系 5 × reaction buffer 2 μl, template total RNA 4 μl, enzyme mix 1 μl, nuclease-free water 3 μl, 反转录条件: 42 °C 1 h, 95 °C 5 min。利用 SYBR® Green master mix, universal RT 试剂盒进行实时荧光定量 PCR 检测,反应在 7500 PCR 仪上进行,扩增条件: 95 °C 10 min, 94 °C 10 s, 60 °C 1 min(采集荧光) 45 个循环,同时以 miR-U6 作为内参。实验结果采用实时定量 PCR 的 Ct 值进行统计分析, Ct 值大于 35 个循环表示低表达或无表达。

1.4 统计学处理 应用 SPSS 17.0 统计软件进行分析,数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示,完全随机设计两组 t 检验。

2 结果

2.1 EBV-miRNA 的扩增曲线 本实验采用 SYBR Green 法进行相对表达量分析,实时荧光定量 PCR 扩增对照 miR-U6、ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p。扩增曲线效果好,熔解曲线无引物二聚体和非特异性扩增(图 1)。鼻咽癌组织中, ebv-miRNAs 扩增曲线的 Ct 值少,起峰早;而鼻咽黏膜炎症组织中, Ct 值大,起峰晚(图 2)。

2.2 鼻咽炎症与鼻咽癌组织中 EBV-miRNAs 表达水平 ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 在鼻咽炎症组织中的 Ct 值明显高于鼻咽癌组织,表明鼻咽低分化鳞癌组织中两种 ebv-miRNAs 表达水平高于鼻咽炎症组织(Ct 值越高,表示起峰所需循环次越多,表达量越低),差异均有统计学意义 ($P < 0.01$)。见表 1。

图1 荧光定量 PCR 产物熔解曲线

A: miR-U6; B: ebv-miR-BART4* ; C: ebv-miR-BART18-3p

图2 荧光定量 PCR 分析 miRNA 表达

A: ebv-miR-BART4* ; B: ebv-miR-BART18-3p

表1 ebv-miRNAs 在鼻咽炎症与鼻咽癌组织中的表达 (Ct 值) 分析

组别	鼻咽炎症组织 (n=32)	鼻咽癌组织 (n=36)	t 值
miR-U6	23.13 ± 1.43	22.92 ± 1.41	0.60
ebv-miR-BART4*	38.49 ± 3.05	26.97 ± 2.67*	16.62
ebv-miR-BART18-3p	39.39 ± 2.16	27.02 ± 2.32*	22.65

与鼻咽炎症组织比较: * $P < 0.01$

3 讨论

恶性肿瘤是我国城乡居民的主要死因之一, 2010 年肿瘤登记数据评估表明全国恶性肿瘤发病率为 235.23/10 万, 死亡率为 148.81/10 万^[6]。近年来, 我国恶性肿瘤的发病率有明显增高趋势。广西是我国鼻咽癌的高发区, 最近统计表明, 广西鼻咽癌的粗死亡率达 6.61/10 万, 占全部恶性肿瘤死亡总数的 5.60%, 在恶性肿瘤死亡分类构成中排列第 4 位^[7]。miRNA 是近年发现的一类内源性非编码 RNA, 大小 21~25 个核苷酸, 研究^[8-9]表明, miRNA 通过抑制靶基因的表达或翻译, 参与细胞的增殖、分化和凋亡调控。新近发现 miRNA 也在人类肿瘤的发生和发展中扮演着重要角色, 发挥癌基因或抑癌基因的作用。依据 miRNA 在肿瘤发生、发展过程中的作用, 可分为原癌 miRNA (OncomiR) 和抑癌 miRNA (TsmiR)。OncomiR 的靶基因是抑癌基因, OncomiR 过表达将导致肿瘤发生。目前, 普遍认为组织或个体发育的某些阶段, 由于 miRNA 基因的启动子持续激活, miRNA 加工的效率增高, 或其稳定性提高等原因, 导致某些 OncomiR 的表达增加, 进而

抑制其靶基因(抑癌基因)的表达, 最终引起肿瘤形成。TsmiR 表达下降或者缺失, 癌基因激活或活性增强, 也将导致肿瘤发生^[10-11]。本实验结果表明, ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 在鼻咽炎症组织中低表达或无表达, 在鼻咽癌组织中高表达, 提示 ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 可能在鼻咽癌的发生中起 OncomiR 作用。

miRNA 的调节网络中, 一个 miRNA 可调控多个靶基因的表达, 某个靶基因的表达也可通过多个 miRNA 的组合来调控。Tazawa et al^[12]发现, miR-34a 在结直肠癌患者中高表达, 通过负调控 E2F1 信号通路而抑制结直肠癌细胞增殖。Wu et al^[13]发现, miR-135 在结肠癌患者中的高表达与结肠癌的局部淋巴结转移、远处转移、及疗效有关。胃癌组织中 miR-192 和 miR-215 的表达水平显著高于非癌胃组织, 有促进肿瘤生长和迁徙, 与肿瘤的侵袭、转移密切相关^[14]。鼻咽癌是来源于鼻咽黏膜上皮的恶性肿瘤, 早期就发生侵袭和转移, 提示 ebv-miR-BART4* 和 ebv-miR-BART18-3p 的高表达可能在鼻咽癌的侵袭和转移中起重要作用。尚未清楚 EBV 是否通过 ebv-miR-BART4*、ebv-miR-BART18-3p 途径作用于靶分子, 参与转录因子的活化, 促进鼻咽癌的早期侵袭、转移。

miRNA 有很强的细胞、组织或疾病特异性, 这些特异表达的 miRNA 既是其功能的基础, 又是相应疾病的特异性标志物^[15]。miRNA 不仅与肿瘤的发生和发展有关, 而且能游离于细胞之外, 稳定存在于外周循环, 具备疾病分子生物标志物的特点, 在多种

肿瘤和非肿瘤疾病的诊断和预后中显示了潜在的价值^[16]。ebv-miR-BART4*、ebv-miR-BART18-3p 有可能是鼻咽癌的特异性生物分子标志物,在鼻咽癌的诊断和靶向治疗中有重要意义。

参考文献

- [1] Song C, Yang S. A meta-analysis on the EBV DNA and VCA-IgA in diagnosis of Nasopharyngeal Carcinoma [J]. *Pak J Med Sci*, 2013, 29(3): 885-90.
- [2] Fang C Y, Lee C H, Wu C C, et al. Recurrent chemical reactivations of EBV promotes genome instability and enhances tumor progression of nasopharyngeal carcinoma cells [J]. *Int J Cancer*, 2009, 124(9): 2016-25.
- [3] 单保恩, 刘丽华. MicroRNA: 癌症诊治新靶点 [J]. *中国肿瘤生物治疗杂志* 2014, 21(6): 603-9.
- [4] Berger F, Reiser M F. Micro-RNAs as potential new molecular biomarkers in oncology: have they reached relevance for the clinical imaging sciences? [J]. *Theranostics*, 2013, 3(12): 943-52.
- [5] Lung R W, Tong J H, To K F. Emerging roles of small Epstein-Barr virus derived non-coding RNAs in epithelial malignancy [J]. *Int J Mol Sci*, 2013, 14(9): 17378-409.
- [6] 陈万青, 张思维, 曾红梅, 等. 中国 2010 年恶性肿瘤发病与死亡 [J]. *中国肿瘤* 2014, 23(1): 1-10.
- [7] 邓伟, 利基林, 叶司原, 等. 广西鼻咽癌死亡的流行趋势分析 [J]. *广西医科大学学报* 2011, 17(2): 73-6.
- [8] Bartel D P. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function [J]. *Cell*, 2004, 116(2): 281-97.
- [9] Wahid F, Shehzad A, Khan T, et al. MicroRNAs: synthesis, mechanism, function, and recent clinical trials [J]. *Biochim Biophys Acta*, 2010, 1803(11): 1231-43.
- [10] Chua J H, Armugam A, Jeyaseelan K. MicroRNAs: biogenesis, function and applications [J]. *Curr Opin Mol Ther*, 2009, 11(2): 189-99.
- [11] Nohata N, Hanazawa T, Kinoshita T, et al. MicroRNAs function as tumor suppressors or oncogenes: aberrant expression of microRNAs in head and neck squamous cell carcinoma [J]. *Auris Nasus Larynx*, 2013, 40(2): 143-9.
- [12] Tazawa H, Tsuchiya N, Izumiya M, et al. Tumor-suppressive miR-34a induces senescence-like growth arrest through modulation of the E2F pathway in human colon cancer cells [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2007, 104(39): 15472-7.
- [13] Wu W, Wang Z, Yang P, et al. MicroRNA-135b regulates metastasis suppressor 1 expression and promotes migration and invasion in colorectal cancer [J]. *Mol Cell Biochem*, 2014, 388(1-2): 249-59.
- [14] Jin Z, Selaru F M, Cheng Y, et al. MicroRNA-192 and-215 are upregulated in human gastric cancer *in vivo* and suppress ALCAM expression *in vitro* [J]. *Oncogene*, 2011, 30(13): 1577-85.
- [15] Bonfrate L, Altomare D F, Di Lena M, et al. MicroRNA in colorectal cancer: new perspectives for diagnosis, prognosis and treatment [J]. *J Gastrointest Liver Dis*, 2013, 22(3): 311-20.
- [16] De Guire V, Robitaille R, Tétreault N, et al. Circulating miRNAs as sensitive and specific biomarkers for the diagnosis and monitoring of human diseases: promises and challenges [J]. *Clin Biochem*, 2013, 46(10-11): 846-60.

Expression of EB virus miR-BART4* and miR-BART18-3p in nasopharyngeal carcinoma and its significance

Li Lu¹, Wang Jianhong¹, Huang Hui², et al

(¹Biochemistry and Molecular Biology Teaching and Research Section of Guilin Medical College, Guilin 541004;

²Dept of Otorhinolaryngology, The Affiliated Hospital of Guilin Medical College, Guilin 541001)

Abstract Objective To analyze expression of EB virus (EBV) miRNAs in nasopharyngeal carcinoma (NPC) tissue, explore molecular mechanism of EBV induced NPC and biomarker for prevention and diagnosis of NPC. **Methods** 36 cases of nasopharyngeal poorly differentiated squamous cell carcinoma tissues and 32 cases of chronic nasopharyngeal mucositis tissues were collected. Expressions of EBV miRNAs ebv-miR-BART4* and ebv-miR-BART18-3p were tested in these tissues by quantitative real-time PCR; the expression level of EBV miRNAs was analyzed in both tissue groups. Results The expressions (Ct) of ebv-miR-BART4* and ebv-miR-BART18-3p were (26.97 ± 2.67) and (27.02 ± 2.32) in NPC tissue, (38.49 ± 3.05) and (39.39 ± 2.16) in nasopharyngeal mucosa inflammation tissue, the expressions of two ebv-miRNAs were significantly higher in NPC tissue than that in nasopharyngeal mucosa inflammation tissue ($P < 0.01$). **Conclusion** NPC may be induced by EBV through the high expression of ebv-miR-BART4* and ebv-miR-BART18-3p. They are potential biological molecular markers for the diagnosis and treatment of NPC.

Key words nasopharyngeal carcinoma; biological marker; ebv-miRNAs