



安徽医科大学学报
Acta Universitatis Medicinalis Anhui
ISSN 1000-1492, CN 34-1065/R

《安徽医科大学学报》网络首发论文

题目：合肥地区地震频发期间青少年躯体化症状调查及相关因素分析
作者：庄宇，汤佩，田英汉，姚鹏，夏磊，刘寰忠
收稿日期：2025-11-17
网络首发日期：2025-12-04
引用格式：庄宇，汤佩，田英汉，姚鹏，夏磊，刘寰忠. 合肥地区地震频发期间青少年躯体化症状调查及相关因素分析[J/OL]. 安徽医科大学学报.
<https://link.cnki.net/urlid/34.1065.R.20251204.1038.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

合肥地区地震频发期间青少年躯体化症状调查及相关因素分析

庄宇^{1,2,3}, 汤佩^{1,2,3}, 田英汉^{1,2,3}, 姚鹏⁴, 夏磊^{1,2,3}, 刘寰忠^{1,2,3}

(¹安徽医科大学第四附属医院精神科, 合肥 238000; ²安徽医科大学精神卫生与心理科学学院, 合肥 230032; ³安徽省精神医学中心, 合肥 230032; ⁴安徽医科大学第四附属医院心胸外科, 合肥 238000)

摘要 目的 拟对合肥地区地震频发期间青少年躯体化症状进行调查, 探讨与地震经历之间的相关性。**方法** 采用横断面调查方法, 选取 324 例合肥地区青少年为调查对象, 收集一般资料及对地震感知、防震培训经历等, 采用躯体化症状自评量表 (SSS)、疲惫量表 (FIS) 分别对躯体化症状和疲惫程度进行评估, 并采用多因素 Logistic 回归分析探讨中学生躯体化症状及疲惫的相关因素。**结果** 324 例青少年中, 躯体化症状的总体检出率为 6.5%, 中度及以上疲惫的检出率为 20.1%。回归分析结果显示, 关注地震时间越长 (≥ 1 h) 的青少年躯体化症状风险越高 ($OR=5.430$, 95% CI: 1.547~19.058), 受过震前培训的青少年疲惫程度较轻 ($OR=0.473$, 95% CI: 0.270~0.829) (均 $P<0.05$)。**结论** 地震频发期间青少年躯体化症状和疲惫程度较高, 应加强健康宣教, 减少对相关事件报道的关注, 进行防震减灾培训, 以提高青少年的身心健康水平。

关键词 地震; 青少年; 抑郁; 躯体化; 疲惫

中图分类号 R 749.94

文献标志码 A

Investigation of somatization symptoms and related factors in adolescents during frequent earthquakes in Hefei

Zhuang Yu^{1,2,3}, Tang Pei^{1,2,3}, Tian Yinghan^{1,2,3}, Yao Peng⁴, XIA Lei^{1,2,3}, LIU Huanzhong^{1,2,3}

(¹Dept of Psychiatry, The Fourth Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei 238000;

²School of Mental And Psychological Sciences, Anhui Medical University, Hefei 230032; ³Dept of

Psychiatry, Anhui Psychiatric Center, Anhui Medical University, Hefei 230032; ⁴Dept of

Cardiothoracic Surgery, The Fourth Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei

238000)

2025-11-17 接收

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号: 82401798); 安徽省高等学校科学研究项目(编号: 2024AH050681、2022AH050671); 安徽省转化医学研究院科研基金(编号: 2022zhyx-B01)

作者简介: 庄宇, 男, 硕士研究生;

夏磊, 男, 博士, 硕士生导师, 副教授, 通信作者, E-mail: xialei@ahmu.edu.cn

Abstract Objective To investigate somatization symptoms in adolescents during frequent earthquakes in Hefei, and to explore their correlation with earthquake experiences. **Methods** A cross-sectional survey was used to select 324 adolescents in Hefei as the survey objects. The self-rating scale of somatization symptoms (SSS) and the exhaustion scale (FIS) were used to evaluate the somatization symptoms and fatigue degree of middle school students, and multivariate logistic regression analysis was used to explore the related factors of somatization symptoms and fatigue among middle school students. **Results** A total of 324 adolescents were included. The overall detection rate of somatization symptoms was 6.5%, and the detection rate of moderate or above fatigue was 20.1%. The results of regression analysis showed that adolescents who were concerned about the earthquake for a longer time (≥ 1 h) had a higher risk of somatization symptoms ($OR=5.430$, 95%CI: 1.547-19.058), and adolescents who received pre-earthquake training had a lower degree of fatigue ($OR=0.473$, 95%CI: 0.270-0.829) ($P<0.05$).

Conclusion During the frequent earthquakes, adolescents have more somatization symptoms and fatigue. Therefore, it is crucial to enhance health education, reduce the emphasis on event-related reports, and implement earthquake prevention and disaster reduction training to improve the physical and mental health of adolescents.

Key words earthquake; adolescents; depression; somatization; fatigue

Fund programs National Natural Science Foundation of China (No. 82401798); Natural Science Research Project of Anhui Educational Committee (Nos. 2024AH050681, 2022AH050671); Research Project of Anhui Provincial Institute of Translational Medicine (No. 2022zhyx-B01)

Corresponding author Xia Lei, E-mail: xialei@ahmu.edu.cn

调查显示，60.7%的男性和 51.2%的女性曾经历过至少一次创伤事件^[1]。灾害不仅会导致躯体伤害，更会对经历者的精神健康产生负面影响，灾害发生后受灾人群常出现创伤后应激障碍、抑郁及失眠等相关心理问题^[2]。地震的危害兼具短期与中长期的影响。国外调查^[4]发现，青少年在地震后短期内出现急性应激症状的发生率高于正常水平^[3]。九寨沟地震发生一年后，64.5%的青少年报告抑郁障碍，46.3%报告创伤后应激障碍（post traumatic stress disorder, PTSD）。法国研究^[5]发现地震后青少年躯体症状障碍（somatic symptom disorder, SSD）与创伤应激症状的风险呈正相关。目前针对国内青少年灾害经历与躯体化症状的相关性研究较少。近年来，国内多地地震频发，合肥地区尤为突出，青少年心理健康亟需关注。

该研究调查了合肥地区青少年躯体化症状与地震经历的关系,为识别和预防灾害引发的心理健康问题的提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

为方便抽样,本研究采用横断面研究设计方法,于2024年9月至10月通过两所合肥地区中学的班主任,将电子问卷转发至班级群,邀请青少年参与线上问卷调查,同时限制同一用户的填写次数避免重复,且需要参与者及监护人的知情同意(2024年9月18日合肥发生4.7级地震,此后频发余震)。纳入标准:性别不限,年龄12~18岁;排除标准:之前明确诊断为精神障碍或躯体疾病的患者。研究对象及监护人均自愿参加本项研究。本次调查共发放330份(点击问卷人数),收回问卷327份,排除明确诊断患有精神疾病和躯体疾病者3例,最终有效样本324份(有效率:99.1%)。调查开始前研究方案已获得安徽医科大学附属巢湖医院医学伦理委员会批准(编号:kyxm-202409-008)。在填写问卷前给每位研究对象及其监护人提供并签署电子知情同意书。

使用PASS 11.0统计软件Confidence Intervals for One Proportion计算最低所需样本量,根据既往研究成果,青少年躯体化障碍的患病率为3.3%^[6],故 p 取0.033; α 取0.05,为了确保估计的高精度和数据的可靠性,设定误差范围为 $\pm 2.5\%$ (即置信区间宽度=5%)。计算得出最低所需样本量为240。

1.2 方法

1.2.1 数据收集

①一般资料:性别(男/女)、学历(初中/高中)、居住地(城市/农村)、父母婚姻关系(正常/离异)等。②地震相关经历:是否参与震前培训,是否参与震后培训,震感感知程度、地震关注时间(包括看新闻、电视或听广播,与别人讨论地震相关信息等,选项为<1 h或≥1 h)^[7]。③躯体化症状自评量表(somatic symptoms scale, SSS)^[8],该量表包含20个条目,采用1~4分等级评分,得分越高代表躯体化症状越严重,总分≥30分为“有”躯体化症状。④疲惫量表(fatigue intensity scale, FIS)^[9],该量表分为0~10分共11个等级,用于评估对象的疲劳程度,评分等级分为:轻度(0~3)、中度(4~6)和重度(7~10)。本研究中SSS的Cronbach's alpha系数为0.904。

1.2.2 统计学处理

使用 SPSS23.0 进行统计分析。对数据进行统计描述，用率和频数表示，组间差异比较采用 χ^2 检验，并对单因素分析中有显著性的变量再进行多因素 logistic 回归分析，给出优势比(ORs)和 95% CIs。采用双侧检验，检验水准 $\alpha = 0.05$ 。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

研究对象的平均年龄为(12.76±1.45)岁;男性180人(55.6%),女性144人(44.4%);初中281人(86.7%),高中43人(13.3%)。居住地、父母婚姻关系等其他资料详见表1。

表 1 不同特征青少年躯体化症状和中度及重度疲惫的检出率[n(%)]

Tab.1 Detection Rates of Somatization Symptoms and Moderate-to-Severe Fatigue in Adolescents by Characteristics [n(%)]

No	71 (21.9)	62 (87.3)	9 (12.6)	4.5	0.033	51 (71.8)	20 (28.1)	3.7	0.054
Yes	253 (78.1)	241 (95.3)	12 (4.7)			208 (82.2)	45 (17.7)		
EQ felt									
None/Mild	113 (34.9)	109 (96.5)	4 (3.54)	1.8	0.181	94 (83.1)	19 (16.8)	1.1	0.285
Mod/Sev	211 (65.1)	194 (91.9)	17 (8.0)			165 (78.2)	46 (21.8)		
EQ-TC									
<1 h	305 (94.1)	288 (94.4)	17 (5.5)	4.7	0.029	246 (80.6)	59 (19.3)	1.0	0.319
≥1 h	19 (5.9)	15 (78.9)	4 (21.0)			13 (68.4)	6 (31.5)		

注: Parental MS: Parental marital status; D/D: Divorced or deceased; Pre-T: Pre-earthquake training; Post-T: Post-earthquake training; EQ felt: earthquake felt; Mod/Sev: Moderate to Severe; EQ-TC: Earthquake time concern; *P* values in bold indicate statistical significance.

2.2 躯体化症状检出率及相关因素

躯体化症状的总体检出率为 6.5%，中度及以上疲惫的检出率为 20.1%。接受过震前和震后培训，以及对地震关注时间较短 (<1 h) 的人群发生躯体化症状的比例较低，受到震前培训人群发生中、重度疲惫的比例较低 (*P*<0.05)。进一步多因素 logistic 回归分析发现，关注地震时间越长 (≥1h) 的青少年躯体化症状风险越高 (*OR*=5.301, 95%CI:1.507~18.653)；受过震前培训的青少年疲惫程度较轻 (*OR*=0.524, 95%CI:0.285~0.966)。

表 2 青少年躯体化症状及疲惫的相关因素的 Logistic 回归分析

Tab. 2 Logistic regression analysis of related factors of somatization symptoms and fatigue in adolescents

Variable	Groups	Number with somatization symptoms			Number with moderate-to-severe fatigue			<i>P</i> value
		<i>OR</i>	95%CI	<i>P</i>	<i>OR</i>	95%CI	<i>P</i>	
Pre-T	No	1.0	Ref		1.0	Ref		0.043
	Yes	0.538	0.198	1.463	0.224	0.535	0.292	
Post-T	No	1.0	Ref		1.0	Ref		0.302
	Yes	0.407	0.146	1.132	0.085	0.704	0.361	

EQ-TC	<1 h	1.0 Ref	1.0Ref					
	≥1 h	5.430	1.547	19.058	0.008	2.103	0.754	5.868

注: *P* values in bold indicate statistical significance.

2.3 具体的躯体化症状及性别分布差异

最常出现的躯体化症状按频率依次为: 紧张不安(22.8%)、睡眠障碍(16.4%)、疲劳乏力(16.0%)。其中,女性在紧张不安、疲劳乏力、情绪不佳、头晕头痛、伤心哭泣、肌肉酸痛、视物模糊、呼吸困难等躯体化症状上检出率高于男性(*P*<0.05),男性在尿频、尿急躯体化症状上检出率上高于女性,但差异无统计学意义。

表3 青少年躯体化症状具体内容及性别分布差异[n(%)]

Tab.3 Specific somatization symptoms and gender differences among adolescents [n(%)]

Index	Total	Female	Male	χ^2	<i>P</i>
Nervousness	74 (22.8)	41 (55.4)	33 (44.6)	4.666	0.031
Sleep disturbance	53 (16.4)	28 (19.4)	25 (13.9)	1.805	0.179
Fatigue and weakness	52 (16.0)	33 (22.9)	19 (10.6)	9.072	0.003
Negative thoughts	49 (15.1)	26 (53.1)	23 (46.9)	1.736	0.188
Low mood and loss of interest	41 (12.7)	25 (17.4)	16 (8.9)	5.195	0.023
Dizziness and headache	40 (12.3)	26 (18.1)	14 (7.8)	7.809	0.005
Irritability and noise sensitivity	34 (10.5)	18 (12.5)	16 (8.9)	1.111	0.292
Memory loss and attention decline	29 (9.0)	13 (9.0)	16 (8.9)	0.002	0.965
Crying easily	28 (8.6)	21 (14.6)	7 (3.9)	11.589	0.001
Muscle aches	25 (7.7)	16 (11.1)	9 (5.0)	4.196	0.041
Compulsive feeling	24 (7.4)	13 (9.0)	11 (6.1)	0.992	0.319
Cardiovascular symptoms	19 (5.9)	11 (7.6)	8 (4.4)	1.479	0.224
Gastrointestinal symptoms	19 (5.9)	10 (6.9)	9 (5.0)	0.548	0.459
Hypochondria	19 (5.9)	11 (7.6)	8 (4.4)	1.479	0.224
Throat discomfort	18 (5.6)	9 (6.3)	9 (5.0)	0.238	0.625
Sweating and shaking	17 (5.2)	8 (5.6)	9 (5.0)	0.050	0.824
Numbness and tingling	16 (4.9)	9 (6.3)	7 (3.9)	0.950	0.330

Blurred vision	14 (4.3)	11 (7.6)	3 (1.7)	6.902	0.009
Dyspnea	12 (3.7)	9 (6.3)	3 (1.7)	4.712	0.030
Frequent and urgent urination	9 (2.8)	3 (33.3)	6 (66.7)	0.116	0.734

注: *P* values in bold indicate statistical significance.

3 讨论

随着经济和社会的快速发展, 我国青少年的心理健康问题日益凸显。最新流行病学调查^[10]显示, 我国儿童青少年的精神障碍总体患病率为 17.5%。自然灾害、事故灾害等心理应激事件也是导致青少年心理健康问题的重要因素。相比成年人, 灾害背景下青少年群体的心理健康更加脆弱, 发生精神行为障碍(如抑郁、自杀等)的风险会大大增加^[11]。

本研究中, 合肥地区地震频发期间青少年躯体化症状的检出率为 6.5%, 高于荟萃分析中青少年筛查 SSD 的患病率(3.3%)^[6]。由此可见地震会对青少年心理健康产生一定负面影响。有研究^[12]表明地震后超过 70% 青少年人群报导了焦虑和抑郁风险, 这可能是躯体化症状表现的根源。此外, 地震引发的心理问题可能与强烈应激反应、不确定性和对生命安全的威胁感有关, 这些因素均可能加剧青少年的焦虑水平, 从而导致躯体化症状的出现。因此, 监测躯体症状对于全面评估青少年的心理健康状况具有重要意义。

进一步分析显示, 关注地震相关报道的时间与躯体化症状风险呈正相关。人们对于空难、地震等灾害的关注时间越长, 发生抑郁、焦虑、失眠以及创伤后应激障碍的风险越高, 这可能是因为媒体对灾害新闻的过度宣传可能会对关注者心理造成负面影响, 尤其是在缺乏辨别能力的青少年中^[13]。此外, 本研究显示, 接受过地震相关培训的青少年躯体化症状和疲惫感程度较低, 甚至在地震之后进行培训, 仍能起到一定保护作用。这可能是因为培训作为一种干预措施增强了青少年的心理韧性, 从而减少精神心理问题的发生^[14]。因此, 通过防震培训和心理教育加强青少年适应灾害的能力至关重要。从社会层面来说, 媒体应当增加关注如灾难期间人们表现的团结、坚韧等正面品质, 激励青少年; 从学校和家庭层面来说, 应当组织开展各种心理教育活动, 引导青少年避免受灾害报道渲染的负面情绪影响。

最为常见躯体化症状具体为紧张不安、睡眠障碍、疲劳乏力, 这提示有灾害后青少年应该加强休息。此外, 在躯体化症状上存在一定的性别差异, 这可能与男女在性激素水平以及躯体生理差异^[15], 或国内社会环境有关^[16]。既往研究^[17]中, 灾害幸存者心理状况也存在类似的性别差异, 提示可以为青少年人群提供基于性别差异的一些干预措施, 如可以给女性提供更多的心理支持和情感表达机会。

本次调查结果有助于了解地震频发期间青少年人群的心理健康水平, 然而, 也存在着一

定的局限性。首先，本研究基于横断面设计，无法直接比较地震前后青少年心理健康状况的差异。其次，由于抽样方法的限制和有限的样本量，可能影响结果的推广。此外，未纳入学业压力、生活事件及方式等混杂因素的影响。未来将采用多中心、更具代表性的样本进行纵向研究，探讨青少年心理问题及相关影响因素。

综上所述，在地震频发期间，青少年群体的躯体化症状和疲惫程度相对较高。增加地震相关培训可以降低该群体心理健康风险，而长时间关注地震报导则是躯体化症状发生的危险因素。因此，应及时实施相关的培训、健康教育和心理干预措施，以减轻地震引发的焦虑情绪，预防地震对青少年身心健康的负面影响。

参考文献

- [1] Kessler R C. Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity survey[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 1995, 52(12): 1048. doi:10.1001/archpsyc.1995.03950240066012.
- [2] Hosseinnejad M, Yazdi-Feyzabadi V, Hajebi A, et al. Prevalence of posttraumatic stress disorder following the earthquake in Iran and Pakistan: a systematic review and meta-analysis[J]. *Disaster Med Public Health Prep*, 2022, 16(2): 801-8. doi:10.1017/dmp.2020.411.
- [3] Efendi G Y, Temeltürk R D, Çakmak I B, et al. Surviving the immediate aftermath of a disaster: a preliminary investigation of adolescents' acute stress reactions and mental health needs after the 2023 Turkey earthquakes[J]. *Children*, 2023, 10(9): 1485. doi:10.3390/children10091485.
- [4] Qi J, Yang X, Tan R, et al. Prevalence and predictors of posttraumatic stress disorder and depression among adolescents over 1 year after the Jiuzhaigou earthquake[J]. *J Affect Disord*, 2020, 261: 1-8. doi:10.1016/j.jad.2019.09.071.
- [5] Fernandez A, Askenazy F, Zeghari R, et al. Somatic and posttraumatic stress symptoms in children and adolescents in France[J]. *JAMA Netw Open*, 2024, 7(4): e247193. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.7193.
- [6] Vesterling C, Schütz-Wilke J, Bäker N, et al. Epidemiology of somatoform symptoms and disorders in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis[J]. *Health Soc Care Community*, 2023, 2023: 6242678. doi:10.1155/2023/6242678.
- [7] Xia L, Yang C, Wang J, et al. Posttraumatic stress symptoms and attitudes toward the China eastern airlines plane crash in transportation students[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(18): 11400. doi:10.3390/ijerph191811400.

- [8] 庄 琦, 毛家亮, 李春波, 等. 躯体化症状自评量表的初步编制及信度和效度研究[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2010(9): 847-9. doi:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2010.09.026
- [8] Zhuang Q, Mao J L, Li C B, et al. Development of the somatic symptoms scale and evaluation of its reliability and validity [J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2010, 19(9): 847-9. doi:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2010.09.026
- [9] Ahlberg K, Ekman T, Gaston-Johansson F, et al. Assessment and management of cancer-related fatigue in adults[J]. Lancet, 2003, 362(9384): 640-50. doi:10.1016/S0140-6736(03)14186-4.
- [10] Li F, Cui Y, Li Y, et al. Prevalence of mental disorders in school children and adolescents in China: diagnostic data from detailed clinical assessments of 17, 524 individuals[J]. J Child Psychol Psychiatry, 2022, 63(1): 34-46. doi:10.1111/jcpp.13445.
- [11] Liang Y, Chen Y, Huang Q, et al. Network structure and temporal stability of depressive symptoms after a natural disaster among children and adolescents[J]. Eur J Psychotraumatol, 2023, 14(1): 2179799. doi:10.1080/20008066.2023.2179799.
- [12] Eroglu M, Yaksı N. Long-term psychopathology rates of children and adolescents and associated factors in the worst-sticken area of 2023 Kahramanmaraş earthquake[J]. Nord J Psychiatry, 2025, 79(1): 26-33. doi:10.1080/08039488.2024.2430245.
- [13] Chao M, Xue D, Liu T, et al. Media use and acute psychological outcomes during COVID-19 outbreak in China[J]. J Anxiety Disord, 2020, 74: 102248. doi:10.1016/j.janxdis.2020.102248.
- [14] Gok M S, Aydin A, Baga Y, et al. The relationship between the psychological resilience and general health levels of earthquake survivor nursing students in Kahramanmaraş earthquakes, the disaster of the century[J]. J Community Psychol, 2024, 52(3): 498-511. doi:10.1002/jcop.23110.
- [15] Oyola M G, Handa R J. Hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-gonadal axes: sex differences in regulation of stress responsivity[J]. Stress, 2017, 20(5): 476-94. doi:10.1080/10253890.2017.1369523.
- [16] 赵 鑫, 刘乐伟, 郝明茹, 等. 青少年抑郁障碍伴发激越症状的预测模型研究[J]. 安徽医科大学学报, 2025, 60(4): 741-7, 754. doi:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2025.04.023.
- [16] Zhao X, Liu L W, Hao M R, et al. Research on the prediction model of agitated symptoms in adolescents with depressive disorders[J]. Acta Univ Med Anhui, 2025, 60(4): 741-7, 754. doi:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2025.04.023.

[17] Carmassi C, Dell' Oste V, Barberi F M, et al. Do somatic symptoms relate to PTSD and gender after earthquake exposure? A cross-sectional study on young adult survivors in Italy[J]. CNS Spectr, 2021, 26(3): 268-74. doi:10.1017/S1092852920000097.

